

সাক্ষাতের সূচী

আপনার ডাক্তারের সাথে আপনার সাক্ষাতের তারিখগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য দয়া করে এই টেবিলে ব্যবহার করুন

সাক্ষাতের তারিখ	গর্ভনিরোধ ব্যবহার	গর্ভধারণ পরীক্ষা	ডাক্তারের স্বাক্ষর
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	
		<input type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Negative Date:	

NPW-BGD-0131

Roaccutane®▼

রোগী সহায়ক নির্দেশিকা

- ▼ ওষধটি গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা / পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন যা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে সহায়ক। চিকিৎসা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তিকে অবশ্যই যে কোন সন্দেহজনক অথবা নিশ্চিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রিপোর্ট করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রিপোর্টিং

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জানাতে আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট বা নার্সের সাথে কথা বলুন।

অথবা আপনি রোশ বাংলাদেশ ড্রাগ সেফটি ইউনিটে সরাসরি রিপোর্ট করতে পারেন ইমেইলের মাধ্যমে -
bangladesh.drugsafety@roche.com অথবা কল করুন + ৮৮০ ১৭৬৬৮৬০৮৬.

Roaccutane® কোন ভাবেই গর্ভাবস্থায় গ্রহণীয় নয়।

গর্ভকালীন সময়ে Roaccutane® গ্রহণ করলে বাচ্চার ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে।

যদি আপনি গর্ভবতী হয়ে থাকেন বা মনে করেন যে আপনি গর্ভবতী হতে পারেন, অবিলম্বে **Roaccutane®** গ্রহণ করা বন্ধ করুন এবং আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

চিকিৎসা শুরু করার আগে প্যাকেজ লিফলেটটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

আপনার **Roaccutane®** সম্পর্কে কোন প্রশ্ন অথবা সেবনের বিষয়ে কিছু জানার থাকলে আপনার ডাক্তার অথবা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।

আপনি গর্ভবতী হতে সক্ষম হলে আপনার যা করণীয় :

❗ আপনাকে গর্ভ-নিরোধের কমপক্ষে ১টি কার্যকর পদ্ধতি (যেমন- intra-uterine device বা an implant) ব্যবহার করতে হবে। চিকিৎসার আগে চিকিৎসার সময় এবং চিকিৎসা বন্ধ করার ১ মাস পরে জন্মানিয়ন্ত্রণের ২ টি কার্যকর পদ্ধতি- (যেমন oral contraceptive এর সাথে কনডম) সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

❗ **Roaccutane®** চলাকালে আপনি গর্ভবতী হতে পারবেন না বা **Roaccutane®** বন্ধ করার ১ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হওয়া যাবে না।

❗ নিয়মিত ফলো-আপ করতে হবে এবং নিয়মিত গর্ভধারণ পরীক্ষা করতে হবে।

- চিকিৎসা শুরু করার আগে আপনাকে অবশ্যই গর্ভধারণ পরীক্ষা করতে হবে, গর্ভবতী নন তা নিশ্চিত হতে হবে।
- আপনি গর্ভবতী না তা নিশ্চিত করতে চিকিৎসার সময় আপনার নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত এবং প্রতি মাসে করাটা বাঞ্ছনীয়। পরবর্তীতে চিকিৎসা বন্ধ করার ১ মাস পরে আপনার একটি সর্বশেষ গর্ভধারণ পরীক্ষা করা উচিত।

পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

এই ওষুধটি শুধুমাত্র আপনার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, অন্য কাউকে খাওয়ার জন্য প্রদান করতে পারবেন না। অতিরিক্ত ওষুধ ফার্মেসিতে জমা দিন।

রোগী সহায়ক নির্দেশিকা

ডাক্তারের নাম :

ডাক্তারের নাম :

টেলিফোন :

টেলিফোন :

মন্তব্য :

মন্তব্য :